

1 Tipo de intervención	Programa
2 Descripción de la intervención	Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) tienen mayor riesgo de infección por hepatitis A y son uno de los grupos en los que se recomienda la vacunación. Desde 2003, el programa facilitaba la vacunación contra la hepatitis A a hombres que tienen sexo con hombres de 19 a 49 años en lugares de encuentro sexual, como las saunas gay, y centros de vacunación de la ciudad. Un equipo compuesto por un médico y una enfermera se desplazaba dos tardes a la semana a los diferentes locales para informar a los usuarios sobre la campaña de vacunación. A los usuarios que decidían vacunarse se les acompañaba a un espacio más discreto, donde se les entrevistaba brevemente y se les administraba la vacuna antihepatitis A+B, A o B según la valoración médica. Durante los primeros meses de la intervención, se llevó a cabo una campaña de comunicación a través de diarios, revistas, páginas web, radio y televisión, especialmente dirigidos al ambiente HSH y a través de tarjetas y pósteres, que incluían información sobre los lugares donde solicitar la vacunación, así como un teléfono y correo electrónico para recibir información personalizada.
3 Principales determinantes de la salud implicados	- Contexto socioeconómico: políticas públicas (educación, salud, servicios sociales, etc.)
4 Principales ejes de desigualdad implicados	Género y diversidad sexual
5 Tipo de evaluación	Evaluación de resultados y evaluación de proceso
6 Diseño de evaluación	Estudio no experimental pre-post
7 Resultados (outcomes)	Evolución mensual de los casos de hepatitis A, cobertura vacunal, características de los vacunados (edad, país de nacimiento, trabajo sexual, lugar y dosis recibidas), percepción de la campaña y vacunación auto declarada
8 Metodología cuantitativa, cualitativa o mixta utilizada	Metodología cuantitativa: registros y cuestionario
9 Fase de la evaluación	Finalizada



10 Principales resultados de la evaluación

Los casos de hepatitis A en HSH disminuyeron en Barcelona (2002: 38, 2003: 38, 2004: 33, 2005: 7, 2006: 5). Hasta 2006, se vacunaron 1.798 personas (1 dosis: 45% (802/1798), 2 dosis: 32% (579/1798) y 3 dosis: 23% (417/1798)). El 13% eran trabajadores sexuales y el 51% extranjeros. El 55% (399/728) de los HSH entrevistados en una encuesta recordaba la campaña y un 16% (111/728) refirió haberse vacunado el año anterior. La campaña de vacunación realizada en saunas y otros lugares de encuentro sexual es una estrategia complementaria a la oferta de vacunación en centros de vacunación convencionales que se muestra factible y efectiva.

11 Documentos relacionados

Informe:

Elia Diez, Patricia G de Olla, Sonia Carvajal, Ferran Barranco, Gemma Prieto, Joan A Caylà. Intervenciones preventivas en saunas de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. sexo con hombres. Premio Virgilio Palacio. 4ª Edición. 2006

Artículo:

Tortajada C, de Olalla PG, Diez E, Pinto RM, Bosch A, Perez U, Sanz M, Caylà JA; Saunas Working Group. Hepatitis A among men who have sex with men in Barcelona, 1989-2010: insufficient control and need for new approaches. BMC Infect Dis. 2012 Jan 20;12:11. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22264382>

12 Organismos implicados

Agència de Salut Pública de Barcelona