

1 Tipo de intervención	Política pública
2 Descripción de la intervención	Ley que, entre otras medidas, incluye la prohibición de consumo en determinados espacios públicos (ampliando los espacios de la ley anterior)
3 Principales determinantes de la salud implicados	-Contexto socioeconómico: políticas públicas (educación, salud, servicios sociales, etc.) -Contexto físico: entorno construido – urbanismo
4 Principales ejes de desigualdad implicados	Clase social, género, edad
5 Tipo de evaluación	Evaluación de resultados
6 Diseño de evaluación	Diseño no experimental pre-post
7 Resultados (outcomes)	Nicotina en fase vapor, PM _{2,5} (partículas más pequeñas de 2,5 micras de diámetro), Presencia de personas fumadoras, Presencia de colillas, Presencia de ceniceros
8 Metodología cuantitativa, cualitativa o mixta utilizada	Metodología cuantitativa: cuestionarios y mediciones ambientales
9 Fase de la evaluación	Finalizada
10 Principales resultados de la evaluación	Disminución muy importante (más del 90%) y significativa de los niveles de nicotina, PM y variables observacionales de consumo de tabaco medidas en locales de hostelería
11 Documentos relacionados	<u>Informe</u> Evaluación del impacto de la Ley 42/2010 en la exposición al humo ambiental del tabaco en la hostelería http://www.seepidemiologia.es/informe-ley-42-2010.pdf <u>Artículo científico</u> López MJ, Fernández E, Pérez-Rios M, Martínez-Sánchez JM, Schiaffino A, Galán I, Moncada A, Fu M, Montes A, Saltó E, Nebot M. Nicotine Tob Res. 2013 May;15(5):992-6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23100458
12 Organismos implicados	Agencia de Salud Pública de Barcelona, Instituto Catalán de Oncología, Instituto de Salud Carlos III, Universidad de Santiago de Compostela, Xunta de Galicia y Generalitat de Cataluña