

1 Tipus d'intervenció

Programa

2 Descripció de la intervenció

Els homes que tenen sexe amb homes (HSH) tenen més risc d'infecció per l'hepatitis A i son un dels grups en els que es recomana la vacunació. Des de 2003 el programa facilitava la vacunació contra l'hepatitis A als homes que tenen sexe amb homes de 19 a 49 anys en locals de trobada sexual, com les saunes gai, i centres vacunals de la ciutat. Un equip compost per un metge i una infermera es desplaçava dues tardes a la setmana als diferents locals per informar als usuaris de la campanya de vacunació. Als usuaris que decidien vacunar-se se'ls acompanyava a un espai més discret, on se'ls entrevistava breument i se'ls administrava la vacuna antihepatitis A+B, A o B segons valoració mèdica. Durant els primers mesos de la intervenció es va dur a terme una campanya de comunicació a través de diaris, revistes, pàgines web, ràdio i televisió, especialment d'ambient HSH i a través de targetes i pòsters, que incloïen informació sobre els llocs on sol·licitar la vacunació, així com telèfon i correu electrònic on rebre informació personal.

3 Principals determinants de la salut implicats

-Context socioeconòmic: polítiques públiques (educació, salut, serveis socials, etc.)

4 Principals eixos de desigualtat implicats

Gènere i diversitat sexual

5 Tipus d'avaluació

Avaluació de resultats i avaluació de procés

6 Disseny d'avaluació

Estudi no experimental pre-post

7 Resultats (outcomes)

Evolució mensual dels casos d'hepatitis A, cobertura vacunal, característiques dels vacunats (edat, país de naixement, treball sexual, lloc i dosis rebudes), percepció de la campanya i vacunació auto declarada

8 Metodologia quantitativa, qualitativa o mixta utilitzada

Metodologia quantitativa: registres i qüestionari

9 Fase de l'avaluació

Finalitzada



Ajuntament de
Barcelona

C S B Consorci Sanitari
de Barcelona



Agència
de Salut Pública

10 Principals resultats de l'avaluació

Els casos d'hepatitis A en HSH van disminuir a Barcelona (2002: 38, 2003: 38, 2004: 33, 2005: 7, 2006: 5). Fins al 2006 es van vacunar 1.798 persones (1 dosi: 45% (802/1798), 2 dosis: 32% (579/1798) i 3 dosis: 23% (417/1798). El 13% eren treballadors sexuals i el 51% estrangers. El 55% (399/728) dels HSH entrevistats en una enquesta recordava la campanya i un 16% (111/728) va referir haver-se vacunat l'any anterior. La campanya de vacunació realitzada en saunes i altres llocs d'intercanvi sexual és una estratègia complementària a l'oferta de vacunació en centres de vacunació convencionals que es mostra factible i efectiva.

11 Documents relacionats

Informe:

Elia Díez, Patricia G de Ollá, Sonia Carvajal, Ferran Barranco, Gemma Prieto, Joan A Caylà. Intervenciones preventivas en saunas de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. sexo con hombres. Premio Virgilio Palacio. 4ª Edición. 2006

Article:

Tortajada C, de Olalla PG, Díez E, Pinto RM, Bosch A, Pérez U, Sanz M, Caylà JA; Saunas Working Group. Hepatitis A among men who have sex with men in Barcelona, 1989-2010: insufficient control and need for new approaches. BMC Infect Dis. 2012 Jan 20;12:11. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22264382>

12 Organismes implicats

Agència de Salut Pública de Barcelona