

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Tipus d'intervenció                                      | Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 Descripció de la intervenció                             | El Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) Baluard que dona un tractament integral pel que fa a addicions per consum de cocaïna o heroïna, i també per alcohol, va oferir durant 4 mesos (des de l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2018) un espai de consum supervisat de drogues les 24 hores                                                                                              |
| 3 Principals determinants de la salut implicats            | <ul style="list-style-type: none"><li>-Context físic: entorn construït - urbanisme (equipaments)</li><li>-Context socioeconòmic: factors econòmics, polítiques públiques, seguretat</li><li>-Entorn: barri</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| 4 Principals eixos de desigualtat implicats                | Classe social, gènere i diversitat sexual, status migratori, accés als serveis sanitaris                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 Tipus d'avaluació                                        | Avaluació de resultats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 Disseny d'avaluació                                      | Estudi no experimental pre-post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 Resultats (outcomes)                                     | Perfil sociodemogràfic de les persones usuàries, ús del serveis sanitaris, patrons de consum de drogues, número de sobredosis no letals                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 Metodologia quantitativa, qualitativa o mixta utilitzada | Metodologia quantitativa: qüestionaris, registres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 Fase de l'avaluació                                      | Finalitzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 Principals resultats de l'avaluació                     | En l'accés a l'espai de consum supervisat obert les 24 hores es va observar un augment de l'ús durant la nit, respecte al dia, de les dones, les persones sense sostre i de persones que consumien estimulants. En general es va observar que no augmentava significativament el risc de sobredosi durant la nit, amb l'excepció d'un major risc de sobredosi en el consum d'heroïna. |
| 11 Documents relacionats                                   | <p><u><a href="#">Article científic</a></u></p> <p>Montero-Moraga JM, Garrido-Albaina A, Barbaglia MG, Gotsens M, Aranega D, Espelt A, Parés-Badell O. Impact of 24-hour schedule of a drug consumption room on service use and number of non-fatal overdoses. A quasiexperimental study in Barcelona. Int J Drug Policy.</p>                                                         |

## 12 Organismes implicats

2020 Jul;81:102772.

<https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102772>

Agència de Salut Pública de Barcelona, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (Universitat de Vic), Unitat docent de Medicina Preventiva i Salut Pública Hospital del Mar-UPF-ASPB



Ajuntament de  
Barcelona

**C S B** Consorci Sanitari  
de Barcelona



Agència  
de Salut Pública